

# LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA): UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA



## AUTOR(ES)

MARTINS, Karine Felipe<sup>1</sup>; DIEL, Eduarda Cristina<sup>1</sup>; MAIA, Isadora Rosa<sup>1</sup>; MORAIS, Bianca Gabrielle Ferreira<sup>1</sup>; SOARES, Lorrany Mendonça Mundim<sup>1</sup>; GONÇALVES, Lídia Andréa Karim<sup>2</sup>; PIRES, Edilene Abdo Rodrigues<sup>1</sup>.

## INSTITUIÇÕES

<sup>1</sup> Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO) - Goiatuba-GO, Brasil.

<sup>2</sup> Faculdade de Medicina de Valença (UNIFAA) - Valença-RJ, Brasil.

## CONTATO

Email: karininha.fm@hotmail.com

WhatsApp: (62) 9 84792862

## INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) trata-se de uma infecção não contagiosa causada por protozoário do gênero *Leishmania*, sendo uma doença de incidência considerável na população pediátrica.

O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise estatística sobre a prevalência da LTA em indivíduos do sexo masculino e feminino menores de 01 ano a 19 anos de idade, no estado de Goiás, entre os anos de 2007 a 2019.

## METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal descritivo sobre LTA em indivíduos menores de 01 ano a 19 anos, no estado de Goiás, por meio do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) no DATASUS. As variáveis analisadas foram à faixa etária, sexo e região entre os anos de 2007 a 2019.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observados 683 casos de LTA em indivíduos menores de 01 ano a 19 anos no período de 2007 a 2019. Houve uma maior prevalência na faixa etária entre 15 a 19 anos, com 251 casos, enquanto uma menor prevalência em indivíduos menores de 01 ano,

sendo 58 casos diagnosticados. Constatou-se ainda uma maior prevalência no sexo masculino, visto que foram identificados um total de 427 casos, contra 256 no sexo feminino.

A maior frequência relativa quanto aos casos diagnosticados de LTA é de 36,75% na faixa etária de 15 a 19 anos, seguida de 28,55% entre 10 a 14 anos, posteriormente 15,51% para 05 a 09 anos e 10,68% de 01 a 04 anos e, por fim, na faixa etária com indivíduos menores de 1 ano tem-se a porcentagem de 8,49%.

## CONCLUSÃO

Portanto, observou-se que a faixa etária de 15 a 19 anos obteve maiores índices para a LTA, apresentando 36,75% dos casos diagnosticados.

## REFERÊNCIAS

